



هدایات برائے فیش فارمنگ

ROHU

Labeo rohita



MORI

Cirrhinus mrigala



THAILA

Gibelion catla



GRASS CARP

Ctenopharyngodon idella



SILVER CARP

Hypophthalmichthys molitrix



MAHSEER

Tor macrolepis



BIG HEAD CARP

Hypophthalmichthys nobilis



ہدایات برائے فیش فارمنگ

تعارف

مچھلی کی کاشت کی تاریخ انسان کے وجود سے منسلک ہے۔ زمانہ قدیم سے اس کا ذکر مختلف کتابوں میں موجود ہے۔ قرآن حکیم میں بھی اس کا ذکر سورہ نحل آیت نمبر 14 میں ملتا ہے۔ ہڑپا اور موئن جو دڑو کے کھنڈرات سے بھی مچھلی کے نمونے ملے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بھی مچھلی انسانی خوراک کا حصہ رہی ہے۔

انسانی خوراک میں پروٹین کی اہمیت مسلمہ ہے۔ ویسے تو پروٹین انسانی خوراک میں استعمال ہونے والی کئی اشیاء میں موجود ہے لیکن گوشت بالخصوص مچھلی کے گوشت میں اس کی تعداد دیگر اشیاء کی نسبت زیادہ ہے۔ ترقی پذیر اور پسماندہ ممالک میں گوشت کا فی کس استعمال ترقی یافتہ ممالک کی نسبت بہت کم ہے جس کی وجہ سے ان ممالک میں عمومی صحت کا معیار بھی بہت پست ہے۔ ملک میں روز افزوں آلودگی سے آبی وسائل بری طرح متاثر ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے قدرتی ذرائع سے مچھلی کی پیداوار پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ ملکی آبادی میں تیزی سے اضافے کی وجہ سے مچھلی کا فی کس استعمال بتدریج مزید کم ہوتا جا رہا ہے جس کا اثر براہ راست عام آدمی کی صحت پر پڑ رہا ہے۔ پروٹین کی کمی سے خصوصاً بچوں کی جسمانی و ذہنی صلاحیت بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ انسانی خوراک میں پروٹین کی کمی کو پورا کرنے کیلئے دیگر ذرائع کے علاوہ فیش فارمنگ جو کہ پروٹین کے حصول کا سب سے موثر ذریعہ ہے کو فروغ دیا جائے۔

گذشتہ چند سالوں میں صوبہ پنجاب میں کئی گنا بڑھتی ہوئی فیش فارمنگ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ محکمہ ماہی پروری پنجاب کی جامع حکمت عملی کی بنا پر فیش فارمنگ ایک صنعت کا درجہ اختیار کر چکی ہے اور یہ آمدن کا ایک نہایت قابل عمل ذریعہ تصور کیا جانے لگا ہے۔ مچھلی فارم بنانے میں فنی مشاورت کیلئے ماہی پروری پنجاب کے مستعد عملہ کی خدمات ہمہ وقت دستیاب ہیں۔ محکمہ ماہی پروری پنجاب نے صوبہ کے تمام اضلاع میں اپنے دفاتر قائم کر رکھے ہیں جہاں سے فیش فارمنگ کیلئے فنی مشاورت بالکل مفت مہیا کی جا رہی ہے۔ فیش فارمنگ کے خواہش مند حضرات کی طرف سے صرف سادہ کاغذ پر درخواست دینے سے محکمہ ماہی پروری پنجاب کا عملہ مجوزہ فیش فارم کیلئے جگہ کے چناؤ، مٹی اور پانی کے تجزیہ، فارم کی ڈیزائننگ اور دیکھ بھال کیلئے بلا معاوضہ فنی مشاورت مہیا کرتا ہے۔

مچھلی فارم بنانے کیلئے چند اہم بنیادی معلومات

جگہ کا چناؤ

کسی بھی فیش فارم کی کامیابی کا انحصار بڑی حد تک مناسب جگہ کے چناؤ پر ہے۔ زرخیز اور اچھی زمین مچھلی کی بہتر پیداوار کی ضامن ہے۔ لیکن نشیبی، سیم زدہ اور کسی حد تک کھراڑی اور بیکار زمین کو بھی مچھلی فارم بنانے کیلئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ مچھلی فارم کیلئے ایسی جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے۔

- ☆ جہاں زمین ریتلی نہ ہو۔ زمین میں پانی کو ٹھہرانے کی صلاحیت موجود ہو۔
- ☆ مچھلی کو فروخت کرنے کے لئے مارکیٹ تک رسائی آسان ہو۔
- ☆ جو سیلابی پانی سے محفوظ ہو۔
- ☆ جہاں مچھلی فارم میں سے بوقت ضرورت آسانی سے پانی نکالا جاسکے۔
- ☆ جہاں فارم تک گاڑی آسانی سے پہنچ سکے۔
- ☆ جہاں بجلی اور مچھلی پالنے کیلئے موزوں پانی سارا سال وافر مقدار میں دستیاب ہو۔
- ☆ جس کے قرب وجوار میں گوبر، پینٹھیں اور چاول کی پھلک وغیرہ آسانی سے دستیاب ہو۔

مٹی

فارم کی کامیابی زمین کے صحیح چناؤ پر منحصر ہے۔ ایسی زمین جس میں پانی ٹھہرانے کی مکمل صلاحیت ہو وہ مچھلی فارم کے قیام کے لئے موزوں تصور کی جاتی ہے۔ ریتلی زمین فیش فارم کیلئے قضا موزوں نہیں ہے کیونکہ ایسی زمین میں پانی نہیں ٹھہرتا اور جو بھی خوراک اس میں ڈالی جائے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ اور مچھلی پالنے کے اخراجات بلا ضرورت بڑھ جاتے ہیں۔ مچھلی فارم کے لئے زرخیز چکنی مٹی والی زمین موزوں ہے فیش فارم بنانے سے پہلے ضروری ہے کہ مٹی کے نمونے حاصل کر کے ان کا محکمہ ماہی پروری کی لیبارٹریوں سے بلا معاوضہ تجزیہ کروایا جائے اور صحیح مٹی کی صورت میں مچھلی فارم بنایا جائے۔ فیش فارم بنانے سے پہلے جگہ کے چناؤ کیلئے محکمہ ماہی پروری کے عملہ سے ضرور مشورہ کیا جائے۔

مچھلی کی کاشت کیلئے موزونیت کے اعتبار سے مٹی کی خصوصیات درج ذیل ہونی چاہئے۔

پانی

مچھلی فارم کیلئے ٹیوب ویل، نہر اور بارش کا پانی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ نہر اور بارش کے پانی کو استعمال کرتے وقت اس بات کو خاص طور پر مد نظر رکھا جائے کہ پانی سارا سال آلودگی سے پاک رہتا ہو اور یہ پانی براہ راست فارم میں داخل نہ ہوتا ہو بلکہ فارم کے موگے میں سے گزر کر آئے جس پر ہدایات کے مطابق باریک جالی لگی ہو تاکہ اس پانی کے ساتھ گوشت خور اور دیگر ناقابل کاشت مچھلیاں اور مچھلی کو نقصان پہنچانے والے دیگر آبی جانور فارم میں داخل نہ ہو سکیں۔ مچھلی تالاب میں پانی کی گہرائی کسی بھی صورت میں پانچ فٹ سے کم نہیں ہونی چاہیے۔

مچھلی کی بہتر افزائش کیلئے پانی میں درج ذیل خصوصیات موجود ہونی چاہئے۔

درجہ حرارت	22 تا 30 درجہ سینٹی گریڈ
گدلا پن	روشنی ایک تا ڈیڑھ فٹ تک پہنچ سکے
پی ایچ (pH)	6.5 سے 8.5 تک

حل شدہ آکسیجن	12 تا 5 پی پی ایم تک
آزاد کاربن ڈائی آکسائیڈ	0.3 تا 0 پی پی ایم تک
اساسیت	75 سے 300 بطور کیلشیم کاربونیٹ
حل شدہ نمکیات	1000 پی پی ایم تک

سورج کی روشنی تالاب میں مچھلی کیلئے قدرتی خوراک بنانے میں مددگار ہوتی ہے۔ پانی کا گدلا پن سورج کی روشنی کو تالاب کے پانی میں گہرائی تک جانے سے روکتا ہے۔ ایسا پانی جس میں سورج کی روشنی ایک تا ڈیڑھ فٹ تک نہ پہنچتی ہو وہ گدلا تصور کیا جاتا ہے۔ اس گد لے پن کے سد باب کیلئے ماہی پروری کے عملہ سے فوراً رجوع کریں۔

مچھلی فارم کی بناوٹ

مچھلی فارم کسی بھی شکل کا بنایا جاسکتا ہے لیکن عموماً مستطیل فارم کو ترجیح دی جاتی ہے کیونکہ مستطیل فارم کی دیکھ بھال اور اس میں سے مچھلی پکڑنا قدرے آسان ہوتا ہے۔ مچھلی فارم کا سائز 2 سے 14 ایکڑ تک موزوں ہے کیونکہ اس سے بڑے سائز کے فارم کا انتظام اور دیکھ بھال محنت طلب اور زیادہ اخراجات کا باعث ہوتا ہے۔ صوبہ پنجاب میں فش فارم کیلئے عموماً ہموار زمین استعمال کی جاتی ہے جس کو دو سے اڑھائی فٹ تک کھود کر اس کے اطراف میں زمین کی سطح سے پانچ سے ساڑھے پانچ فٹ اونچے بند بنا کر سات سے ساڑھے سات فٹ گہرا مچھلی فارم بنایا جاتا ہے۔ بند اوپر سے دس سے بارہ فٹ تک چوڑا رکھا جاتا ہے اور اس کی اندرونی ڈھلوان 1:2 رکھی جاتی ہے۔ تالاب کی تہہ کی ڈھلوان 1:100 رکھی جاتی ہے۔ ایسے فارم چھ سے سات فٹ تک گہرا پانی ٹھہرانے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ اگر ایک سے زیادہ فارم بنانا مقصود ہو تو ہر فارم میں پانی ڈالنے اور نکالنے کا علیحدہ بند و بست ضروری ہے۔

نوٹ:

مچھلی فارم کے ساتھ نرسری کے تالاب بنانا از حد ضروری ہے۔ نرسری تالاب کا رقبہ پیداواری تالاب کے کل رقبہ کے چھٹے حصہ کے برابر ہونا چاہیئے۔ نرسری تالاب میں ہچریوں / نرسیوں سے چھوٹا بچہ مچھلی اپریل سے اگست کے دوران خرید کر پالا جاتا ہے تاکہ نومبر سے فروری کے دوران مچھلی پکڑنے کے بعد فوری طور پر اسے پیداواری تالاب میں منتقل کیا جاسکے کیونکہ عموماً اس موسم میں بڑے بچہ مچھلی کا حصول مشکل ہو جاتا ہے اور پیداواری تالاب کی شاکنگ میں تاخیر نقصان کا موجب بنتی ہے۔ فارم حضرات کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ مچھلی فارم کی ڈیزائننگ کے لئے محکمہ ماہی پروری کے ضلعی دفتر سے رجوع کریں تاکہ ڈیزائننگ میں خامی کی صورت میں ہونے والے کسی بھی ممکنہ نقصان سے بچا جاسکے۔

کھا دوں کا استعمال

مچھلی فارم کے پانی کی سبزی مائل رنگت اس میں موجود قدرتی خوراک کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ قدرتی خوراک فارم میں پالی

جانے والی مچھلی کی بہترین خوراک ہے جس کا تمام تر دار و مدار تالاب کے پانی کی زرخیزی پر ہے۔ پانی کی زرخیزی کو بڑھانے کے لئے کھادوں کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ فارم میں قدرتی خوراک میں اضافہ کا موجب بنتی ہیں اور مچھلی کی پیداوار پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں مچھلی فارم میں دو طرح کی کھادیں استعمال کی جاتی ہیں۔

1- نامیاتی کھادیں

2- غیر نامیاتی کھادیں

نامیاتی کھادیں:

نامیاتی کھادوں میں گائے کا گوبر، مرغی کی بیٹھیس، ناقابل استعمال گلی سڑی سبزیاں اور پھل وغیرہ شامل ہیں۔

غیر نامیاتی کھادیں:

ان کھادوں میں نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاشیم کے مرکبات شامل ہیں یہ کھادیں ایمنیم نائٹریٹ سپر فاسفیٹ، ڈائی ایمنیم فاسفیٹ (DAP) اور یوریا کی شکل میں مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔

استعمال

نامیاتی و غیر نامیاتی کھادوں کی مندرجہ ذیل مقدار تجویز کی جاتی ہے تاہم اس امر کی ہدایت کی جاتی ہے کہ کھادوں کے

استعمال سے قبل محکمہ ماہی پروری کے عملہ سے مشاورت کی جائے۔

☆ کھادوں کا استعمال مارچ سے اکتوبر تک کریں۔

☆ بارش اور مسلسل آبر آلود موسم کے دوران کھادوں کا استعمال نہ کیا جائے۔

☆ تمام غیر نامیاتی کھادوں کو پانی کی سطح پر پھیلا کر ڈالیں۔

نامیاتی کھادیں فارم کی تہہ پر پانی بھرنے سے قبل فارم میں پانی بھرنے کے بعد

(مقدار فی ایکڑ) (مقدار فی ایکڑ)

500 گلوگرام ہر پندرہ روز بعد 6000-8000 گلوگرام

گوبر

یا
30-35 گلوگرام روزانہ

اگر گوبر کی بجائے مرغی کی بیٹھیس استعمال کرنی ہوں تو

200 گلوگرام ہر پندرہ روز بعد 2000-2500 گلوگرام

مرغی کی بیٹھیس

یا
12-15 گلوگرام روزانہ

غیر نامیاتی کھادیں

۱۔ فاسفورس پلس 5 کلوگرام فی ایکڑ ہفتہ وار

یوریا 5 کلوگرام فی ایکڑ ہفتہ وار

نوٹ: اگر زمین کلراکھی نوعیت کی ہو تو اس کے لئے نیوٹری کیلشیم کھاد (محلول کی شکل میں) 10 کلوگرام فی ایکڑ فی پندرہواڑہ کا استعمال گد لے پن کو روکتا ہے اور اس کی پیداواری صلاحیت کو بہتر بناتا ہے۔

۲۔ دیگر غیر نامیاتی کھادیں

اگر زمین اور پانی اساسی نوعیت 8-9 pH کی ہوں تو کھادوں کی مندرجہ ذیل اقسام اور مقدار استعمال کی جائے۔

پہلی خوراک

ہر پندرہ روز بعد

سنگل سپر فاسفیٹ 75 کلوگرام فی ایکڑ 25 کلوگرام فی ایکڑ

ایمونیم نائٹریٹ 75 کلوگرام فی ایکڑ 25 کلوگرام فی ایکڑ

اگر زمین اور پانی موزوں نوعیت (یعنی پی ایچ 6.5-8.5) کے ہوں تو کھادوں کی مندرجہ ذیل اقسام اور مقدار استعمال کی جائے۔

ڈائی امونیم فاسفیٹ 27 کلوگرام فی ایکڑ 9 کلوگرام فی ایکڑ

یوریا 6 کلوگرام فی ایکڑ 2 کلوگرام فی ایکڑ

ڈائی امونیم فاسفیٹ (DAP) کو استعمال کرنے سے قبل دس سے پندرہ گھنٹے پہلے کسی بڑے برتن میں بھگو کر رکھیں اور پھر

گھول کر پانی کی سطح پر پھیلا کر ڈالا جائے۔

شاکنگ بچہ مچھلی

محکمہ ماہی پروری پنجاب کے زیر اہتمام اس وقت صوبہ پنجاب کے تقریباً تمام اضلاع میں ہچریوں اور نرسیوں کا قیام عمل میں آچکا ہے جہاں سے قابل کاشت مچھلیوں کا صحت مند پونگ وافر مقدار میں ارزاں نرخوں پر فارمز کو فراہم کیا جاتا ہے۔ یہ تمام مچھلیاں سبزی خور ہیں اور فارم میں بیک وقت پالی جاتی ہیں۔ مچھلی کی نوع کا انتخاب علاقہ کے درجہ حرارت اور موسمیاتی تغیر کو مد نظر رکھ کر کرنا چاہیے تاکہ تالاب سے بہتر پیداوار و آمدن حاصل کی جاسکے۔ نرسری تالاب میں تجویز کردہ تعداد بچہ مچھلی پیداواری تالاب میں تجویز کردہ بچہ مچھلی سے پچاس فیصد زیادہ ہونا چاہیے۔ نرسری اور پیداواری تالاب میں شاک کئے جانے والے بچہ مچھلی کا اوسط وزن، تعداد اور تناسب درج ذیل ہونا چاہیے۔

درمیانی میدانی پنجاب:

لاہور، شیخوپورہ، قصور، اوکاڑہ، فیصل آباد، گوجرانوالہ، سرگودھا وغیرہ شامل ہیں۔

قسم مچھلی	نرسری تالاب تعداد فی ایکٹر	پیداواری تالاب تعداد فی ایکٹر
	(اوسط وزن 5 گرام)	(اوسط وزن 150-200 گرام)
روہو	360	240
موری	180	120
سلور کارپ یا بگ ہیڈ	480	320
گراس کارپ	180	120
کل تعداد	<u>1200</u>	<u>800</u>

پنجاب ساؤتھ زون:

ملتان، ڈیرہ غازی خان، بہاولپور ڈویژن کے اضلاع

اس زون میں رہو مچھلی کی بڑھوتری باقی اقسام سے زیادہ ہے۔ لہذا ان علاقوں میں درج ذیل نسبت سے

مچھلیوں کو کاشت کیا جائے۔

قسم مچھلی	نرسری تالاب تعداد فی ایکٹر	پیداواری تالاب تعداد فی ایکٹر
	(اوسط وزن 5 گرام)	(اوسط وزن 150-200 گرام)
روہو	480	320
موری	180	120
سلور کارپ یا تھیلا یا بگ ہیڈ	300	200
گراس کارپ	240	160
کل تعداد	<u>1200</u>	<u>800</u>

پوٹھوہار زون:

جہلم، راولپنڈی، اٹک، چکوال کے اضلاع

ان اضلاع میں درجہ حرارت کافی کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے رہو اور موری کی بڑھوتری بہت کم ہوتی ہے۔ اور تھیلا مچھلی

سردی برداشت نہ کر پاتی ہے۔ اس وجہ سے ان علاقوں میں کاشت کرنا ناموزوں ہے۔ ان علاقوں میں گراس کارپ اور سلور کارپ کی

بڑھوتری مناسب حد تک ہے۔ لہذا ان علاقوں میں ان کی تعداد زیادہ رکھی جائے۔

قسم پھلی	نرسری تالاب تعداد فی ایکڑ	پیداواری تالاب تعداد فی ایکڑ
	(اوسط وزن 5 گرام)	(اوسط وزن 150-200 گرام)
روبو	180	120
موری	180	120
سلور کارپ یا یگ ہیڈ	360	240
گراس کارپ	480	320
کل تعداد	<u>1200</u>	<u>800</u>

اضافی خوراک

پھلی کی بہتر نشوونما اور بہتر پیداوار حاصل کرنے کے لئے فارم کی پیداواری صلاحیت کو بہتر بنانے کے لئے ساتھ ساتھ اور مقامی طور پر آسانی سے دستیاب اجزاء مثلاً چاول کی پھک، چھان بورا، کھل مکئی اور شیرہ وغیرہ پر مشتمل خوراک کا استعمال کیا جاتا ہے۔
اضافی خوراک کے تجویز کردہ اجزاء درج ذیل ہیں۔

50%	- رائس بران / رائس پالش یا چھان بورا
40%	- سویا بین میل
9%	- شیرا
1%	- وٹامنز اور نمک

یا

50%	- رائس بران / رائس پالش یا چھان بورا
30%	- میٹھ گلوٹن (30% پروٹین)
9%	- شیرا
10%	- سویا بین میل
1%	- وٹامنز اور نمک

مقدار خوراک

اوپر تجویز کردہ دونوں خوراکوں میں کسی ایک خوراک کے تمام اجزاء کو باہم ملا کر نرسری تالاب میں موجود بچہ پھلی کے وزن کا

خوراک کا استعمال ماہ مارچ سے اکتوبر تک کرنا چاہیے جبکہ سرد موسم میں اس کا استعمال ضرورت کے مطابق کم کر دینا چاہیے۔

گراس کارپ کے لئے سبز چارہ کا استعمال

تالاب میں بچہ مچھلی شاک کرنے سے پہلے اس امر کی یقین دہانی کر لی جائے کہ گراس کارپ کے لئے سبز چارہ کا مناسب بندوبست کر لیا گیا ہے۔ گراس کارپ کے لئے سبز چارہ مثلاً برسین، مکئی، جوار وغیرہ باریک کاٹ کر مچھلی کی ضرورت کے مطابق روزانہ تالاب میں ڈالیں۔ چارہ ڈالنے کے لئے بہتر ہے کہ بانس کا 8 فٹ لمبا اور 8 فٹ چوڑا چوکھٹا بنا کر پانی کی سطح پر رکھ کر اس میں چارہ ڈالا جائے۔

نوٹ: خوراک ڈالنے کی جگہ اور اوقات کو مخصوص ہونا چاہیے۔

چونے کا استعمال

اگر زمین تیزابی (یعنی پی ایچ 6.5-6) ہو تو چونے کا استعمال کیا جاتا ہے جس سے پانی کی pH مناسب سطح پر آ جاتی ہے۔ فارم بنانے کے بعد جراثیم و دیگر مضر کیڑوں کو چونا ڈال کر بھی ختم کیا جاسکتا ہے۔ چونا ڈالنے سے حل شدہ آکسیجن کی مقدار اور فارم کی زرخیزی بڑھ جاتی ہے۔ چونا مندرجہ ذیل مقدار میں زمین کی pH کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر زمین اساسی نوعیت کی ہو تو چونے کی بجائے جیسم کا استعمال صرف محکمہ عملہ کی ہدایات کے مطابق کیا جائے۔

زمین کی pH	زمین کی قسم	سالانہ چونے کی مقدار (کلوگرام فی ایکڑ)
6.5 تا 5.0	مناسب تیزابی	400
7.5 تا 6.5	تیزابی نہ اساسی	250

تجویز کردہ مقدار کو اقساط میں استعمال کرنے کی بجائے یکمشت استعمال کیا جائے۔

مچھلی فارم بنانے کے لئے اخراجات و آمدن کا تخمینہ

صوبہ پنجاب میں عام طور پر ہموار زمین کی دو سے اڑھائی فٹ تک مٹی کھود کر تالاب کے اطراف میں 5 سے 5.5 فٹ سطح زمین سے اوپر بند بنا کر 7.5 فٹ گہرا مچھلی فارم بنایا جاتا ہے۔ بند اوپر سے دس سے بارہ فٹ تک چوڑا رکھا جاتا ہے اور اس کی اندرونی ڈھلوان 1:2 کے تناسب سے رکھی جاتی ہے۔ تالاب کی تہہ کی ڈھلوان 1:100 کے تناسب سے رکھی جاتی ہے۔ ایسے فارم پر فی ایکڑ اخراجات و آمدن کا تخمینہ درج ذیل ہے۔

لاگت برائے تعمیر

بذریعہ بلڈوزر	بذریعہ ٹریکٹر	
60,000/- روپے	80,000/- روپے	کھدائی و بندوں کی مضبوطی
30,000/- روپے	30,000/- روپے	تعمیر موگا جات و نالی
10,000/- روپے	10,000/- روپے	متفرق اخراجات
100,000/- روپے	120,000/- روپے	کل لاگت

نوٹ:- بلڈوزر ایگریکلچرل انجینئرنگ ڈیپارٹمنٹ اپنے مقررہ زرعی نرخوں پر فراہم کرتا ہے۔

سالانہ اخراجات

60,000/- روپے	- پانی ٹیوب ویل
6,000/- روپے	- بچہ مچھلی
15,000/- روپے	- غیر نامیاتی کھادیں
20,000/- روپے	- نامیاتی کھادیں
15,000/- روپے	- اضافی خوراک
8,000/- روپے	- چارہ برائے گراس کارپ
24,000/- روپے	متفرق اخراجات
<u>148,000/- روپے</u>	- کل اخراجات سالانہ
1300/- کلوگرام	کل سالانہ پیداوار مچھلی
260,000/- روپے بحساب 200/- روپے فی کلوگرام	کل سالانہ آمدن
1,12,000/- روپے	خالص سالانہ آمدن

نوٹ: دیا گیا خالص منافع درمیانے درجے کی مینجمنٹ کو مد نظر رکھ کر بنایا گیا ہے اچھی مینجمنٹ اور پانی کی کوالٹی کو مزید بہتر بنا کر خالص منافع میں خاطر خواہ حد تک اضافہ کیا جاسکتا ہے۔ نیز ایک ایکڑ کے مچھلی فارم پر ٹیوب ویل لگانا اور کل وقتی ملازم رکھنا منافع بخش نہیں ہے۔ اگر کاروباری نقطہ نظر سے مچھلی پالنا مقصود ہو تو مچھلی فارم کا رقبہ کم از کم آٹھ تا دس ایکڑ پر مشتمل ہو۔ ایسے فارم پر کل وقتی ملازم رکھنا اور ٹیوب ویل لگانا اقتصادی لحاظ سے مناسب ہے۔ چھوٹا فارم صرف اسی صورت میں نفع بخش ہے۔ اگر یہ زراعت، لائیو سٹاک یا پولٹری سے منسلک ہو۔

مچھلی فارم بنانے کیلئے حکومت کی فراہم کردہ مراعات

- ☆ فارم کے ڈیزائن و دیگر امور پر محکمہ پروری پنجاب کے توسیعی عملہ کے ذریعے بلا معاوضہ فنی معلومات و مشورہ جات کی فراہمی۔
- ☆ سرکاری ناکارہ زمین کا محکمہ مال سے پٹہ پر حصول۔
- ☆ فارم بنانے کیلئے محکمہ زراعت سے بلڈوزر کی رعایتی نرخوں پر فراہمی۔
- ☆ زرعی ترقیاتی بینک سے قرضے کی سہولت۔
- ☆ مچھلی فارم کیلئے نصب نیوب ویل کیلئے واپڈا کی طرف سے زرعی نرخوں پر بجلی کی فراہمی۔
- ☆ محکمہ ماہی پروری پنجاب کی جانب سے فش فارمنگ سے منسلک افراد کیلئے مفت تربیت و فنی معلومات۔
- ☆ محکمہ ماہی پروری پنجاب کی طرف سے قابل افزائش مچھلیوں کے پونگ کی سستے نرخوں پر فراہمی۔
- ☆ پانی، مٹی اور بیماری کی تشخیص کی سہولیات۔
- ☆ مچھلی فارم بنانے کے لئے گورنمنٹ کے آسان قرضہ سکیم میں شمولیت۔

☆ عام طور پر مچھلی کو گرمیوں میں کھانے سے گریز کیا جاتا ہے۔ سائنسی طور پر اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، البتہ مچھلی کو افزائش نسل کے دورانیہ میں نہیں پکڑنا اور کھانا چاہیے تاکہ اس کی نسل کشی بہتر طور پر ہو سکے اور قدرتی پانیوں میں اس کی تعداد مناسب حد تک برقرار رہ سکے۔

☆ اکثر یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ مچھلی کھانے کے بعد دودھ پینے یا دہی کھانے سے برص (سفید دھبے) کی بیماری ہو جاتی ہے جو کہ صحیح نہ ہے۔ اس کا سائنسی ثبوت نہیں ملتا۔

☆ برصغیر میں عام طور پر بڑی مچھلی کو کھانے پر زور دیا جاتا ہے اس کی وجہ شاید کارپ مچھلی میں موجود کانٹے ہیں جو مچھلی بڑا ہونے پر موٹے ہو جاتے ہیں اور آسانی سے انہیں الگ کیا جاسکتا ہے لیکن اس کے برعکس بڑی مچھلی کی نسبت چھوٹی مچھلی کا گوشت غذائی اعتبار سے زیادہ فائدہ مند ہے۔

شعبہ نشر و اشاعت

محکمہ فشریز پنجاب، 9-اے، بہاولپور روڈ، چوہدری، لاہور

فون نمبر: 042-99212374-75، فیکس: 042-99212386

www.punjabfisheries.gov.pk - www.fwf.punjab.gov.pk

E-mail: fishdept@hotmail.com



محکمہ فشریز پنجاب، 9-اے، بہاولپور روڈ،
چوہدری، لاہور۔

فون نمبر: 042-99212374-75 فیکس: 042-99212386
www.punjabfisheries.gov.pk - www.fwf.punjab.gov.pk
 E-mail: fishdept@hotmail.com